

Reinigungs- und Desinfektionsplan allgemeiner Bereich in Kindereinrichtungen



STERN-Waschmittel GmbH Friedensstraße 2 b

06667 Weißenfels

Tel: 03443-33987-0

fax: 03443-33987-20

www.sternwaschmittel.de

Stand 11.05.2016

Bereich	Häufigkeit Reinigung oder Desinfektion	Personen- kreis	Methode	Präparat/Mittel	Konzen- tration	Zubereitung	Einwirk- ungszeit
Einrichtungsgegenstände (Spielzeug, Laufgitter, Beschäftigungsmaterial) Schrankoberflächen, Heizkörper	1x wöchentlich reinigen Spielzeug von Säuglingen täglich reinigen	Personal	feucht abwischen	STERN- Allesreiniger oder Alkoholsoftreiniger	0,5 - 1 %	50 - 100 ml auf 10 l Wasser	
Essenausgabe	nach Arbeitsschluss und nach Verunreinigung reinigen	Personal	feucht abwischen	STERN-Kraftreiniger	0,5 - 1 %	50 - 100 ml auf 10 l Wasser	
Planschbecken	nach jeder Benutzung, bei Verschmutzung reinigen	Personal	auswaschen	STERN- Allesreiniger	0,5 - 1 %	50 - 100 ml auf 10 l Wasser	
Fußböden	täglich reinigen	Personal	auswischen	STERN- Allesreiniger oder Alkoholsoftreiniger Wischpflege	0,5 - 1 %	50 - 100 ml auf 10 l Wasser	
Alle Oberflächen von Gegenständen oder Schränken, Regalen und Fußböden, Spielzeug, Waschbecken u.ä.	nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten, Stuhl, trocken vorreinigen, dann desinfizieren	Personal	Aufschäumen und wischen.	DESCOSEPT spezial	Pur	gebrauchsfertig	1 Minute
Reinigungsgeräte Reinigungstücher und Wischbezüge	1x wöchentlich reinigen arbeitstäglich waschen	Personal	abwaschen waschen möglichst in Maschine	STERN-Kraftreiniger STERN- Vollwaschpulver	0,5 - 1 % Maschinen- anweisung	50 - 100 ml auf 10 l Wasser	
Fieberthermometer	nach jeder Benutzung desinfizieren	Personal	Aufschäumen und wischen.	DESCOSEPT spezial	Pur	gebrauchsfertig	1 Minute

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Desinfizierte Flächen/Gegenstände sind vor Hautkontakt bzw. vor dem Einsatz anderer Reinigungsmittel und vor Kontakt mit Lebensmitteln mit klarem Wasser abzuspülen.

Bei Infektionsausbruch sind alle Kontakt- und Verkehrsflächen mit Optisept zu behandeln. Die jeweilige Dosierung ist abhängig von der Befallsart der Produktinformation zu entnehmen. Eine vollviruzide Wirkung wird mit 2%-iger Lösung bei 60 Minuten Einwirkzeit erreicht.

Unterschrift Hygienebeauftragter